

삼킴장애, 콧줄, 뱃줄의 의료-윤리-법제도-정책

강민정 (효자병원)

일반적인 도덕적 접근 ~

- 일반적인 도덕적 접근은 원칙에 입각한다.
- 원칙 : 그 결정이 초래 할 결과 & 권리 & 정당성을 묻는다.
- 의료적 시술이 도덕적으로 인정받기 위한 일반적 원칙 : 시술의 목적이 무엇인가?

삼킴장애, 경관급식(콧줄, 뱃줄) 의료적 접근

- 영양 및 수분공급을 더 이상 경구로 안전하고 충분하게 섭취할 수 없을 때 다시 가능하게 될 때까지 일시적으로 또는 장기적으로 영양 및 수분을 인공적으로 제공하는 방법 중에 하나이다.
- 급성기, 아급성기 환자에게는 분명한 치료적 목적이 있다.

삼킴장애, 경관급식(콧줄, 뱃줄) 의료적 접근

- 초기, 중기 치매환자에서 발생하기도 하는 건강을 해칠 정도의 중증 삼킴장애는 경관급식이 분명한 치료적 목적을 갖는다.
- 말기 치매환자의 중증 삼킴장애는 신경생리학적 퇴화로 인하여 더 이상의 호전을 기대할 수 없는 상태이므로 이때 경관급식은 치료적 목적보다는 상태유지 또는 진행지연을 위한 지지적 목적이 더 크다.

말기치매환자의 경관급식 도덕적 접근~

- 일반적인 의료시술의 목표와 같은 반열에
 - + 현재 환자의 자기 결정권
 - + 과거 환자의 취향/유언/사전의향서
 - + 가족의 사회문화적 종교적 정서적 성향
 - + 담당의료인&환자돌봄자의 종합적 의견
 - + 의료적 접근성

우리나라 국민 대다수 유교적 사고방식이
콧줄 더더군다나 뺏줄에 대한 경계가 크다.